



TABLEAU DE CONSERVATION DES PRÉPARATIONS COMMERCIALES POUR NOURRISSONS

Prête à servir		48 h au réfrigérateur
Concentrée	Si reconstitué avec de l'eau	24 h au réfrigérateur
	Si non reconstitué avec de l'eau	48 h au réfrigérateur
Préparation en poudre après dilution		24 h au réfrigérateur maximum
Boîte de poudre ouverte		1 mois à la température de la pièce Conserver au sec (pas au réfrigérateur ni au congélateur).
Température ambiante		Pas plus que 2 heures, que le lait ait été chauffé ou non, qu'il soit reconstitué avec de l'eau ou non.

Notes importantes :

- Les préparations commerciales ne peuvent être congelées.
- Pour la manipulation des préparations commerciales en poudre pour nourrissons, Santé Canada recommande de mélanger avec de l'eau bouillie puis refroidie à 70 °C pour ces nourrissons seulement :
 - Bébés prématurés âgés de moins de 2 mois
 - Bébés nés avec un poids insuffisant âgés de moins de 2 mois
 - Bébés immunodéficients



Pour tous les autres bébés, il est sécuritaire de reconstituer les préparations en poudre pour nourrissons avec de l'eau bouillie qui a été refroidie à la température ambiante.

Il est préférable de donner la préparation en poudre pour nourrissons mélangée avec de l'eau immédiatement au bébé. Vous pouvez ainsi remplir des biberons d'eau bouillie à l'avance, les réfrigérer, ajouter la poudre juste avant de nourrir le bébé, après avoir tiédi le biberon.

Si vous préférez mettre en réserve des biberons déjà prêts pour usage, Santé Canada précise que le biberon doit être donné au bébé dans les 24 heures lorsqu'il est réfrigéré à 4 °C (température normale d'un frigo).